Examen de Admisión

Nombres y Apellidos:

1. [15 pts] Sea (X, d) un espacio métrico compacto y $F : X \rightarrow X$ una aplicación que preserva la métrica. Pruebe que $F(X) = X$.

2. [15 pts] Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función de clase C^1 satisfaciendo $|f'(x)| \leq k < 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Pruebe que la función,

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(x, y) = (x + f(y), y + f(x)),$$

es un difeomorfismo sobre $\mathbb{R}^2$.

3. [15 pts] Sea $\alpha = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{C}^3$ y $T : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ la transformación lineal que satisface

$$T(e_1) = 3e_1 + ie_2, \quad T(e_2) = -ie_1 + 3e_2, \quad T(e_3) = 4e_3, \quad \text{con } i^2 = -1.$$

(a) Determine la matriz de T en la base canónica.

(b) Encuentre los valores y vectores propios de T .

4. [15 pts] Una curva que tiene una pendiente dada por $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$, pasa por el punto $(2, 1)$. Determine su ecuación de la curva.

Examen de Ingreso Doctoral - ??/??/2023

Nombre y apellido: _____

1. Sea X, Y espacios metricos y $f : X \rightarrow Y$ una función continua. Demuestre que si X es compacto, entonces $f(X)$ es también compacto.

2. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & (x, y) \neq 0 \\ 0 & x = y = 0 \end{cases} .$$

2-a. Pruebe que f es continua en $(0, 0)$

2-b. Encuentre $\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0)$ y analise su continuidad en $(0, 0)$.

2-c. La función f es diferenciable en $(0, 0)$? En caso afirmativo, encuentre su diferencial en este punto.

3. Sea $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de todos los polinomios reales de grado menor o igual a 3 y considere el producto interior

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx.$$

Encuentre $a \in \mathbb{R}$ de modo que $p(x) = x$ y $q(x) = x + 2ax^2$ sean ortogonales.

4. Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y}{x + y}.$$

SOLUCIONARIO

1. Sea $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una cobertura por abiertos de $f(X)$. Por continuidad, $f^{-1}(A_\alpha)$ es abierto para todo $\alpha \in I$. Además,

$$\begin{aligned} x \in X &\implies f(x) \in f(X) = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \implies f(x) \in A_\alpha \text{ para alguno } \alpha \in I \\ &\implies x \in f^{-1}(A_\alpha) \text{ para alguno } \alpha \in I. \end{aligned}$$

Portanto, $X = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$ y $\mathcal{B} := \{f^{-1}(A_\alpha), \alpha \in I\}$ es una cobertura por abiertos de X . Como X es compacto, $\mathcal{B}$ admite subcobertura finita, o sea, existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in I$ satisfaciendo

$$X = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(A_{\alpha_i}) \implies f(X) = f\left(\bigcup_{i=1}^n f^{-1}(A_{\alpha_i})\right) = \bigcup_{i=1}^n f(f^{-1}(A_{\alpha_i})) \subset \bigcup_{i=1}^n A_{\alpha_i},$$

o que prueba que $\mathcal{A}$ admite subcobertura finita y portanto $f(X)$ es compacto.

2-a. Una vez que,

$$\left| \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \right| \leq 1 \quad \text{and} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 + y^2 = 0,$$

tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 + y^2 \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right),$$

y por lo tanto,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0),$$

probando la continuidad de f em $(0, 0)$.

2-b. Si $x = 0$, tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{|h|}\right) = 0.$$

y para $x \neq 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) = 2x \sin\left(\frac{1}{|x|}\right) - \frac{x}{|x|} \cos\left(\frac{1}{|x|}\right).$$

Como

$$x_n = \frac{1}{2\pi n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_n, 0) = -1,$$

tenemos que $\frac{\partial f}{\partial x}$ no es continua en $(0, 0)$.

2-c. Como $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ tenemos que

$$\frac{f(h, k) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k}{|(h, k)|} = \frac{(h^2 + k^2)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}}\right) = \sqrt{h^2 + k^2} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{h^2 + k^2}}\right),$$

y por lo tanto

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)h - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)k}{|(h, k)|} = 0,$$

probando que f es diferenciable en $(0, 0)$ con $f'(0, 0) \equiv 0$.

3. Si $p(x) = x$ y $q(x) = x + 2ax^2$, entonces

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 x(x + 2ax^2) dx = \int_0^1 (x^2 + 2ax^3) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{ax^4}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{a}{2}.$$

Así, p y q son ortogonales, si y sólo si

$$\langle p, q \rangle = 0 \iff a = -\frac{2}{3}.$$

4. Tenemos que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y}{x + y} \iff \underbrace{(x - y)}_{M(x, y)} dx + \underbrace{(x + y)}_{N(x, y)} dy.$$

Como,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -1 \neq 1 = \frac{\partial N}{\partial x},$$

la ecuación no es exacta. Sin embargo, multiplicando la ecuación por el factor integrante $\frac{1}{x^2 + y^2}$, nos fornece la ecuación

$$\underbrace{\frac{x - y}{x^2 + y^2}}_{\bar{M}(x, y)} dx + \underbrace{\frac{x + y}{x^2 + y^2}}_{\bar{N}(x, y)} dy,$$

con

$$\frac{\partial \bar{M}}{\partial y} = \frac{y^2 - 2xy + x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial \bar{N}}{\partial x},$$

que es exacta. Así, la solución es dada implícitamente por $F(x, y) = C$, donde F satisface

$$F(x, y) = \int \bar{M} dx + g(y).$$

Como

$$\int \frac{x-y}{x^2+y^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+y^2} dx - \int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{x}{y}\right),$$

tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial y} \int \frac{x-y}{x^2+y^2} dx = \frac{y}{x^2+y^2} + \frac{x}{y^2} \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{x+y}{x^2+y^2} = \bar{N}(x,y),$$

y así $g(y)$ es constante y concluimos que y es dado implícitamente como función de x en la ecuación

$$\frac{1}{2} \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) = C$$

Examen de Admisión 2025

Programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Matemática
Facultad de Ciencias - Departamento de Matemática
Universidad de Tarapacá

Nombre _____ RUN _____

Instrucciones

Justifique cada una de sus respuestas.

Tiene 2 horas para resolver el examen.

1. **(8 puntos)** Sea $\mathcal{P}_m$ el conjunto de los polinomios de coeficientes reales de grado igual o menor que n . Si $T : \mathcal{P}_m \rightarrow \mathcal{P}_m$ definido como

$$Tp(x) = 5p(x) - 4p'(x) + p''(x), \quad \forall p(x) \in \mathcal{P}_m.$$

Encuentre una base para el núcleo y la imagen de T .

2. **(8 puntos)** Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^4}{x^4 + 6y^8}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) **(8 puntos)** Es f continua en $(0, 0)$? Justifique rigurosamente su respuesta.

b) **(8 puntos)** Qué ocurre con las derivadas parciales de f en $(0, 0)$?

3. **(75 puntos)** Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$y' = -\frac{x^2 + xy}{3xy + y^2}$$

4. **(10 puntos)** Sean (X, d) , (Y, ρ) espacios métricos y $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ una función.

a) **(6 puntos)** Pruebe que si f es continua, entonces la imagen inversa de cualquier conjunto abierto en (Y, ρ) es un conjunto abierto en (X, d) .

b) **(4 puntos)** Si $K \subset X$ es abierto, el conjunto $f(K)$ es abierto en (Y, ρ) ? Si su respuesta es afirmativa, demuéstrelo, y si es negativa exhiba un contraejemplo.